

Waarom moet ik ontwormen?



Het hebben van een huisdier betekent een verrijking van je leven. Huisdieren houden je gezelschap, maken je aan het lachen, helpen je te ontspannen en zorgen ervoor dat je voldoende lichaamsbeweging krijgt. Kinderen die samen met een huisdier opgroeien ontwikkelen betere sociale vaardigheden en leren sneller verantwoordelijkheid te nemen. Om optimaal van je huisdier te kunnen genieten moet je echter wel zorgen voor de gezondheid van je huisdier en daarmee ook voor je eigen gezondheid.

- ⊙ Huisdieren kunnen besmet zijn met wormen zonder dat ze ziek zijn
 - ➔ Uitscheiding van onzichtbare eitjes,
 - ➔ Risico op besmetting van andere dieren, maar ook van de mens.

- ⊙ Mogelijke volgen van een worminfectie bij de mens:



"Larva migrans" Spoelwormlarven kunnen ontstekingen veroorzaken in lever, longen, ogen of hersenen.



Haakwormen kunnen door de huid heen dringen.



"Alveolaire echinococose" overgedragen door de vossenlintworm.

- Versterking van de allergische verschijnselen bij kinderen met aanleg voor astma door een spoelworminfectie.

- ⊙ Spoelwormeitjes werden gevonden in*:

- de uitwerpselen van 4,4% van de honden en de vacht van 12,2% van de honden,
- de uitwerpselen van 4,6% van de katten en de vacht van 3,4% van de katten.

- ⊙ 19% van de Nederlandse bevolking heeft antistoffen tegen de spoelworm en is dus in contact geweest met spoelwormlarven. Op oudere leeftijd neemt dit toe tot 40%**.

➔ Neem hygiënische maatregelen (zoals opruimen van de uitwerpselen of handen wassen na contact met dieren en voor het eten)

➔ **Ontworm uw huisdier minstens 4 keer per jaar.** Waarom 4 keer?

- ⊙ Uw dier kan de dag na de ontworming terug besmet raken met wormen (door contact met besmette dieren of plaatsen of het eten van prooi).

➔ **Met een regelmatige behandeling kunt u het risico op ei-uitscheiding en dus het risico voor de volksgezondheid tot een minimum beperken.**

- ⊙ **Opgelet: als u een ontwormingsmiddel gebruikt, dat geen wormlarven doodt, blijft de hond besmet en gaat de ei-uitscheiding sneller opnieuw beginnen!**

Ontwormen met Profender® - Waarom?

Spectrum **BREEDTE**:

DOELTREFFEND TEGEN



Lintwormen

Spoelwormen

Haakwormen

Zweepwormen

Spectrum **DIEPTE**:



Profender® doodt de onvolwassen en volwassen wormen in de darm en de migrerende larven in de vitale organen.


Andere middelen tegen maag-darm wormen doden de volwassen (en evt. ook de onvolwassen) wormen in de darm.


GRONDIGERE ONTORMING → Het duurt langer voor de ei-uitscheiding opnieuw begint.

Gemakkelijke toediening:

 Profender® kat is een **pipet** (huiddruppels) in de nek.

- Behandeling zonder stress voor uw kat en uzelf,
- Verzekerde opname van het product (geabsorbeerd door de huid) → geen weggegooid geld zoals bij tabletten die soms weer worden uitgespuugd.



 Profender® hond is een **smakelijke tablet in beenvorm**, die u met plezier aan uw hond zult willen geven.

Profender Spot-on oplossing voor kleine, middelgrote en grote katten. **Werkzame bestanddelen:** Profender bevat 21,4 mg/ml emodepside en 85,8 mg/ml praziquantel. **Doelid:** Katten. **Indicaties voor gebruik:** Voor katten die lijden aan of het risico lopen op gemengde parasitaire infecties veroorzaakt door rondwormen en lintwormen van de volgende soorten: Rondwormen (nematoden): Toxocara cati (onvolgroeide en volwassen stadia, L4 en L3), Toxascaris leonina (onvolgroeide en volwassen stadia en L4), Ancylostoma tubaeforme (onvolgroeide en volwassen stadia en L4), Lintwormen (cestoden): Dipylidium caninum (volwassen stadia), Taenia taeniaeformis (volwassen stadia), Echinococcus multilocularis (volwassen stadia). **Contra-indicaties:** Niet gebruiken bij kittens jonger dan 8 weken of van minder dan 0,5 kg. **Bijwerkingen:** In zeer zeldzame gevallen kunnen speeksel en braken optreden. Men veronderstelt dat dit zich voordoet ten gevolge van likken aan de plaats van toediening door de kat onmiddellijk na de behandeling. In zeer zeldzame gevallen werd na toediening van Profender voorbijgaande alopecie, pruritus en/of ontsteking ter hoogte van de toedieningsplaats waargenomen. **Dosering en behandelingschema:** De aanbevolen minimale dosis is 3 mg/kg lichaamsgewicht emodepside en 12 mg/kg lichaamsgewicht praziquantel, equivalent met 0,14 ml/kg lichaamsgewicht Profender. Een eenmalige toediening per behandeling is doeltreffend. REG NL 10334 UDA

Profender 15 mg/3 mg tabletten met geregleerde afgifte voor kleine honden. Profender 50 mg/10 mg tabletten met geregleerde afgifte voor middelgrote honden. Profender 150 mg/30 mg tabletten met geregleerde afgifte voor grote honden. **Werkzame bestanddelen:** Elke Profender tablet bevat 1 mg/kg Emodepside en 5 mg/kg Praziquantel. **Doelid:** Honden. **Indicaties voor gebruik:** Voor honden die lijden aan of het risico lopen op gemengde parasitaire infecties veroorzaakt door rondwormen en lintwormen van de volgende soorten: Toxocara canis (onvolgroeide en volwassen stadia, L4 en L3), Toxascaris leonina (onvolgroeide en volwassen stadia en L4), Ancylostoma caninum (onvolgroeide en volwassen stadia), Uncinaria stenocephala (onvolgroeide en volwassen stadia), Trichuris vulpis (onvolgroeide en volwassen stadia), Dipylidium caninum, Taenia spp., Echinococcus multilocularis (volwassen en onvolgroeide stadia), Echinococcus granulosus (volwassen en onvolgroeide stadia). **Contra-indicaties:** Niet gebruiken bij pups jonger dan 12 weken of van minder dan 1 kg. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor één van de werkzame bestanddelen of één van de hulpstoffen. **Bijwerkingen:** Geen. **Dosering:** Profender wordt toegediend aan een minimum dosering van 1 mg/kg lichaamsgewicht emodepside en 5 mg/kg lichaamsgewicht praziquantel. Een eenmalige toediening per behandeling is doeltreffend. REG NL 100206 UDA

Bayer B.V. • Animal Health Division • Energieweg 1 • NL-3641 RT Mijdrecht • Tel. 0297/280 480 • www.companion.bayer.nl
UDA, receptplichtig middel, gebruiksinstructies op de verpakking of in de bijlsuiter. Voor verdere informatie die is toegesndeden op uw specifieke situatie kunt u zich wenden tot uw dierenarts. De informatie in deze publicatie heft een algemeen karakter en kan daarom nooit het advies van uw dierenarts vervangen. Deze informatie is afkomstig van Bayer B.V. • Animal Health Division • Energieweg 1 NL-3641 RT Mijdrecht • Tel. 0297/280 480 • www.companion.bayer.nl